

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-3-72 287550

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN n° 138 de MARS 1972

9 Mars 1972 / n° 3

ARBRES FRUITIERS

Traitements de pré-débourrement

Ces traitements s'effectuent selon les produits utilisés, du stade B (gonflement des bourgeons, légère pointe verte au sommet) au stade C³ (le sommet des jeunes feuilles est visible mais celles-ci encore repliées dans le bourgeon), parfois D (stade "oreille de souris").

Cette époque est favorable à des contaminations par des champignons tels que : Nectria (chancres) sur pommiers, Tavelure sur poiriers, Monilia sur cerisiers et par de nombreuses maladies bactériennes sur poiriers et cerisiers.

Certains insectes (anthonomes, chenilles diverses) reprennent leur activité; des pontes de pucerons sont prêtes à éclore, donc plus sensibles aux insecticides.

Les produits à utiliser sont :

- Les colorants nitrés : seuls, ou en mélange dans des spécialités huileuses (Huiles jaunes). Les employer jusqu'au stade C, mais ne pas dépasser ce stade.
- Les huiles blanches : seules, certaines sont spécialement recommandées contre les pontes d'araignées rouges. Ces spécialités qui peuvent être utilisées entre le stade D et E (dégagement des boutons floraux) sont incompatibles avec le soufre et certains fongicides et insecticides.
- Les oléoparathions : Ils peuvent être utilisés selon les doses jusqu'au stade D-E. ils sont alors actifs contre les jeunes chenilles de toutes sortes, les premières colonies de pucerons (pucerons verts, et pucerons cendrés plus redoutables que les premiers).
- Les sels de cuivre (oxychlorures ..., bouillie bordelaise - formulation poudre prête à l'emploi -) peuvent être incorporés aux colorants nitrés, oléoparathions ou utilisés seuls, - ne pas dépasser le stade C³. Eviter d'utiliser des sels de cuivre sur Golden, à cette époque de l'année (risques de ressetting après floraison). Sur poiriers par contre il est recommandé de les utiliser en mélange ou seuls avec les insecticides cités plus haut; en effet les pustules chancreuses de tavelure sur rameaux sont à l'origine de contaminations très précoces, dès le départ de la végétation.

CLOQUE DU PECHER : Pour combattre ce champignon il est important d'intervenir de bonne heure, dès que les bourgeons atteignent le stade B.

Les produits les plus efficaces sont à base de :

Captafol 160 g. M.A./HL; Zirame, Thirame 180 g. MA./HL ;
Captane 250 g. M.A./HL ; les oxychlorures de cuivre 500 g. Cu métal/HL

En période humide, renouveler le traitement.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

H. de MEIRLEIRE

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE,

J. DELATRE

7346